

DE

Gebrauchsinformation: DEXERYL® Creme

Was DEXERYL® Creme enthält

Glycerin, Vaseline, flüssiges Paraffin, Glycerolmonostearat, Stearinsäure, Polydimethylcyclsiloxan, Silikonöl, Macrogol 600, Trolamin, Propyl-4-hydroxybenzoat (E 216), gereinigtes Wasser.
Packungsgrößen: 50 g und 250 g. Pumpspender 500 ml.

Wofür DEXERYL® Creme angewendet wird

Schützende Hautpflegecreme zur Behandlung der Anzeichen und Symptome von Hauttrockenheit (Xerosis) insbesondere bei verschiedenen Hauterkrankungen wie Neurodermitis oder Ichthyose.

Wie DEXERYL® Creme wirkt

DEXERYL® Creme wurde für die Behandlung der Anzeichen und Symptome von trockener Haut (Xerosis) entwickelt.

- **Filmbildende Wirkung:** Vaseline und flüssiges Paraffin bilden einen Film, der

- den Verlust von Feuchtigkeit aus der Haut physikalisch hemmt und damit der Austrocknung vorbeugt
- und gegen äußere Einflüsse schützt.

- **Feuchtigkeitsspendende Wirkung:** Zusätzlich erhält Glycerin das Gleichgewicht der Feuchtigkeit in der Haut.

Dank der speziellen Formulierung verringert DEXERYL® Creme Hautreizungen und beugt ihnen vor.

Wie DEXERYL® Creme anzuwenden ist

Tragen Sie die Creme ein- bis zweimal täglich dünn auf die betroffenen Hautpartien auf, oder bei Bedarf auch häufiger, aber nicht mehr als sechsmal pro Tag. Nur zur äußerlichen Anwendung.

DEXERYL® Creme darf nicht angewendet werden

bei Überempfindlichkeit (Allergie) gegen einen der Bestandteile der Creme insbesondere gegen Propyl-4-hydroxybenzoat - E 216.

DEXERYL® möglichst nicht gleichzeitig mit anderen äußerlich aufzutragenden Produkten anwenden, da hierzu keine Erfahrungen vorliegen. Wenn Sie sich nicht sicher sind, bitten Sie Ihren Arzt um Rat.

Warnhinweise und besondere Hinweise für die Anwendung

- Nicht auf Wunden auftragen.
- Nicht schlucken.
- Nicht in der Nähe der Augen anwenden.
- DEXERYL® für Kinder unzugänglich aufbewahren.

Mögliche Nebenwirkungen

In **seltenen Fällen** können ekzemartige allergische Hautreaktionen sowie **vereinzelt** Sofortreaktionen mit Nesselsucht (Urtikaria) auftreten, da die Creme Propyl-4-hydroxybenzoat enthält. Informieren Sie bitte Ihren Arzt, wenn Sie unerwünschte Wirkungen oder Nebenwirkungen bemerken, die nicht in dieser Gebrauchsinformation aufgeführt sind.

Besondere Vorsichtsmaßnahmen für die Aufbewahrung

Nicht über 30 °C lagern. Sie dürfen DEXERYL® nach dem auf dem Pumpspender angegebenen Verfallsdatum nicht mehr verwenden.

Letzte Überarbeitung der Gebrauchsinformation: 12/2010.

Jahr der CE-Kennzeichnung: 2011.